

INDICATIES MONDMASKERS

Algemene maatregel: hergebruik je PBM de hele shift! (max. 8u)

Preventief masker

- » Alle administratieve en ondersteunende diensten.



Chirurgisch mondmasker

- » Alle medewerkers met patiëntencontact, tenzij indicatie FFP2-masker.
- » Alle medewerkers met **aërosolproducerende symptomen** (hoesten, niezen).
- » **Zwangere zorgverleners.**
- » In propere en vuile zones van de **CSA.**
- » Operatiekwartier



FFP2-masker (eendenbek)

- » Bij **aërosol-vormende procedures.**
Vb. respiratoire staalafname, bronchoscopie, intubatie, aspiratie, toedienen aërosol, enz.
- » **Corona:** bij het betreden van de kamer/unit.
- » **Endoscopie-unit.**
- » **Operatiekwartier: bij hoog-risico ingrepen.**
- » Bij lichte en zware **ademhalingskinesitherapie.**
- » In de **verloskamer.**
- » **CSA** bij bewerking van corona-besmet materiaal.



! Werp je masker weg na het uitvoeren van intubatie/ extubatie, CPR, bronchoscopie of open aspiratie !

FFP3-masker

- » Bij het uitvoeren van een **intubatie, CPR, bronchoscopie en NKO/MKA-ingrepen bij een covid-positieve patiënt.**
Werp je masker weg na deze handeling.

