HHZH_INF_397.01(1025)
SAPnr.11270

# PATIËNTENINFORMATIE

# Linker coloscopie

HEILIGHART
ALGEMEEN ZIEKENHUIS LIER

een **hart**
voor zorg

## Voorwoord

Je behandelende arts heeft samen met jou besproken dat je een dat je een klein darmonderzoek of linker coloscopie moet ondergaan.

Als aanvulling op de uitleg die je reeds kreeg van jouw arts, biedt deze informatiebrochure je bijkomende informatie.

Bij vragen kan je steeds terecht op de volgende telefoonnummers:

MDL- secretariaat: ☎ 03 491 27 79
(Maag-, darm- en leverziekten)

## 1. Wat is een linker coloscopie?

Een linker coloscopie is een onderzoek van **het laatste deel van de dikke darm.**

Langsheen de anus wordt een soepele buis ingebracht met aan het uiteinde een camera of endoscoop. Op die manier kan de arts het slijmvlies van de darm onderzoeken. Er kunnen ook kleine stukjes weefsel, biopten, weggenomen worden voor microscopisch onderzoek.

Bij een biopsie wordt het slijmvlies beschadigd, waardoor er een kleine kans op een bloeding na het onderzoek bestaat. Neem je bloedverdunnende medicatie? Bespreek vooraf met je arts of en hoe lang deze medicatie moet onderbroken worden.



## 2. Het onderzoek

### 2.1. Voorbereiding op het onderzoek

- Je moet **niet** nuchter zijn voor een klein darmonderzoek.
- Bespreek met je arts of je moet stoppen met bloedverdunners voor de ingreep.
- Breng vóór het onderzoek de arts op de hoogte van:
    - ▶ Medicatie die je inneemt of tot voor kort innam (zeker bloedverdunners)
    - ▶ Allergieën
    - ▶ Ademhalingsproblemen
    - ▶ Hartproblemen
    - ▶ Kunstkleppen hart
    - ▶ Zwangerschap (of vermoeden van)
- Voor de linker coloscopie moet het laatste deel van de darm leeg zijn.

Er wordt in het ziekenhuis voor het onderzoek een klein lavement toegediend.

**Verhinderd**
Bent je verhinderd voor het onderzoek? Neem dan tijdig contact op met secretariaat MDL op 03/491 27 79. We maken dan een nieuwe afspraak.

### 2.2. Uitvoering

- Je neemt plaats op de onderzoekstafel op je linkerzijde.
- De arts onderzoekt de aars eerst met de vinger.
- Vervolgens wordt de endoscoop via de anus ingebracht en geleidelijk verder opgeschoven.
- Om het zicht te verbeteren wordt er lucht in de darm geblazen.
- De arts zal mogelijk weefselstaaltjes van de darm nemen. Dit is niet pijnlijk en veroorzaakt hooguit wat bloedverlies.

**Het onderzoek zelf duurt meestal een 15-tal minuten.** Een klein darmonderzoek doet normaal geen pijn en vereist meestal geen verdoving. In bepaalde gevallen kan verdoving wel aangewezen zijn. De arts bespreekt dit met je.

### 2.3. Na het onderzoek

Door de lucht die in de darm geblazen werd, kan je tot 30 minuten na het onderzoek een gevoelige onderbuik hebben. Dit gaat meestal over als je wat wind hebt kunnen maken. Je kan na het onderzoek het ziekenhuis verlaten.

### 2.4. Bijwerkingen

Verwikkelingen van een linker colonscopie zijn zeer uitzonderlijk.
Na het nemen van biopten kan er beperkt bloedverlies zijn.

### 2.5. Wat breng je mee?

- Identiteitskaart
- Medicatielijst
- Reservekledij
- Eventueel recente bloeduitslagen
- Verwijsbrief van je dokter

**Waardevolle voorwerpen blijven best thuis!**

## 3. Vragen?

Heb je nog vragen na het lezen van deze brochure? Heb je hevige pijn of koorts? Neem dan contact op met:

**Tijdens kantooruren:**
MDL- secretariaat: ☎ 03 491 27 79
(Maag-, darm- en leverziekten)

**Buiten kantooruren:**
Spoedgevallendienst ☎ 03 491 29 00

## Notities

## Notities

© 2025 HeiligHartziekenhuis

HeiligHartziekenhuis | Mechelsestraat 24, 2500 Lier
www.heilighartlier.be | T: 03/491 23 45

Afspraken via het MDL-secretariaat: 03/491 27 79